
EDOXABAN POLPHARMA®

ФОКУС. ПРЕЦИЗНОСТ. ЗАЩИТА.



Xa=Factor Xa

Директна инхибиция на Factor Xa – ключовата точка в коагулационния път

точна мишена | защита | блокиране | контрол | доверие

polpharma

ОТ ДИАГНОЗА ДО ПРАВИЛНАТА ДОЗА[1]

Алгоритъм за назначаване на edoxaban при НКПМ според актуалните препоръки на ESC 2024:

1 ПОСТАВЯНЕ НА ДИАГНОЗА НКПМ

2 ОЦЕНКА ПО CHA_2DS_2-VA SCORE

♀ Женският пол отпада от актуалните критерии за оценка

C	Хронична сърдечна недостатъчност
H	Хипертония
A_2	Възраст ≥ 75 години
D	Захарен диабет
S_2	Прекаран инсулт, ТИА, или артериален тромбоемболизъм
V	Съдова болест
A	Възраст 65-74 години

ОАК се препоръчват при CHA_2DS_2-VA score ≥ 2 и трябва да се имат предвид при CHA_2DS_2-VA score = 1

3 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛНАТА ДОЗА EDOXABAN POLPHARMA

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА - 60 mg

НАМАЛЕТЕ ДОЗАТА ДО
30 mg ПРИ ≥1 КРИТЕРИЙ

- **БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ** (CrCl 15-50 ml/min)
- **НИСКО ТЕЛЕСНО ТЕГЛО** (≤60 kg)
- **P-GP ИНХИБИТОРИ** (циклоспорин, дронедарон, еритромицин, кетоконазол)

Edoxaban 30 mg демонстрира най-ниска честота на големи и гастроинтестинални кръвоизливи спрямо apixaban, dabigatran и rivaroxaban[2]

4 НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТЕН ДНЕВЕН ПРИЕМ

1x ДНЕВНО

НКПМ - неклапно предсърдно мъждене
ESC - European Society of Cardiology
ТИА - транзиторни исхемични атаки
ОАК - орални антикоагуланти
CrCl - креатининов клиърънс
P-gp - P-гликопротеин

EDOXABAN POLPHARMA®

МЕТААНАЛИЗ ПРИ НКПМ, 2023 г.[3]

17 НАБЛЮДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ




EDOXABAN ДЕМОНСТРИРА:[3]

- **По-нисък риск от инсулт/системна емболия** спрямо **dabigatran, rivaroxaban** и **apixaban**
- **По-нисък риск от голямо кървене** спрямо **dabigatran** и **rivaroxaban**
- **Сходен риск от голямо кървене** с **apixaban**

EDOXABAN, RIVAROXABAN И APIXABAN: СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ПРИ ВТЕ, 2022 г.[4]

СХОДНА ЕФИКАСНОСТ



Сходен риск
от рецидиви на венозен тромбоемболизъм

СХОДЕН ПРОФИЛ НА БЕЗОПАСНОСТ



Сходен риск
от интракраниално и гастроинтестинално кървене

ВТЕ - венозен тромбоемболизъм

EDOXABAN POLPHARMA®

ФОКУС. ПРЕЦИЗНОСТ. ЗАЩИТА.

ЛЕСНО ДОЗИРАНЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЯСЕН КРИТЕРИЙ ЗА РЕДУКЦИЯ И ЕДНОКРАТЕН ДНЕВЕН ПРИЕМ[1]

ПО-НИСЪК РИСК ОТ ГОЛЯМО КЪРВЕНЕ И ОТ ИНСУЛТ/СИСТЕМНА ЕМБОЛИЯ СПРЯМО ДРУГИ ОАК (ПРИ ПАЦИЕНТИ С НКПМ)[3]

СХОДЕН ПРОФИЛ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЕФИКАСНОСТ СПРЯМО APIXABAN И RIVAROXABAN (ПРИ ПАЦИЕНТИ С ВТЕ)[4]

КЛИНИЧНО ДОКАЗАН ПРИ ВИСОКОРИСКОВИ ПАЦИЕНТИ С НКПМ ≥75 ГОДИНИ И МНОЖЕСТВО КОМОРБИДНОСТИ[5]



Лекарствен продукт по лекарско предписание.
КХП Edoxaban Polpharma 30 mg; 60 mg - BG/MA/MP - 71305-7/06.03.2026
За повече информация: „З.Ф. Полфарма – клон България“, бул. „Симеоновско шосе“ 85 „З“, тел. 02/4400843, www.polpharma.bg, ИАЛ-39031/29.09.2026.

Референции:
1. Van Gelder IC, et al. Препоръки 2024 на ESC за поведение при предсърдно мъждене, разработени в сътрудничество с Европейската асоциация по кардио-торакална хирургия (EACTS). Eur Heart J. 2024;45(36):3314–3414. **2.** Verdecchia P, et al. Safety and efficacy of non-vitamin K oral anticoagulants in non-valvular atrial fibrillation: a Bayesian meta-analysis approach. Expert Opin Drug Saf. 2015;14(1):7–20. **3.** Zhang B, et al. Effect of edoxaban compared with other oral anticoagulants for stroke prevention in patients with atrial fibrillation: A meta-analysis. Heliyon. 2023;9(11):e21740. **4.** Fukasawa T, et al. Comparative effectiveness and safety of edoxaban, rivaroxaban, and apixaban in patients with venous thromboembolism: A cohort study. J Thromb Haemost. 2022;20(9):2083–2097. **5.** Giugliano RP, et al. Edoxaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2013;369(22):2093–2104.

Ръководство за предписващия лекар

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции
Бихме искали да напомним, че медицинските специалисти са задължени, според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), да съобщават незабавно на Притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

polpharma