КАРТА НА ПАЦИЕНТА

Едоксабан Полфарма
филмирани таблетки
едоксабан
Моля, носете тази карта у себе си по всяко време.

Представете я на Вашия медицински специалист, фармацевт, лекар или зъболекар преди всякакво медицинско лечение или процедура.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Име на пациента:

Дата на раждане:

В спешен случай моля, свържете се с:

Име:

Телефон №:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО
(Да се попълни от лекар)

Едоксабан Полфарма се предписва за приложение веднъж дневно с доза: mg

Започнат на: / (мм/гг)

Кръвна група:

Други лекарства/заболявания:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАЩИЯ ЛЕКАР

За повече информация или при спешни случаи, моля, свържете се с:

Име на лекаря:

Телефон №, печат на лекарския кабинет:

Подпис на лекаря:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

- Едоксабан Полфарма е перорален антикоагулант, инхибитор на фактор Ха.
- Когато се налага инвазивна процедура, Едоксабан Полфарма трябва да се прекрати най-малко 24 часа предварително и да се подходи с нужната предпазливост.
- Едоксабан Полфарма може да повиши риска от кървене. В случай на клинично значимо кървене, прекратете незабавно лечението.
- Коагулационните тестове, като например международно нормализирано съотношение (INR), протромбиново време (PT) или активирано частично тромбопластиново време (aPTT), не са полезна мярка за ефекта на Едоксабан Полфарма. Но един калибриран антифактор Ха тест може да помогне за информирани клинични решения.

Моля, вижте Кратката характеристика на продукта (КХП) за повече информация.

ЗА ВАШЕТО ЛЕЧЕНИЕ

Предписано Ви е Едоксабан Полфарма, противосъсирващо лекарство, което разрежда кръвта и помага да се предотврати образуването на кръвни съсиреци. Важно е да приемате това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар.

- Ако пропуснете една доза, приемете я незабавно и след това продължете на следващия ден както обикновено – не приемайте двойна на предписаната доза в един и същи ден.
- Не започвайте никакви други лекарства (включително и такива, отпускани без рецепта), без да се консултирате с Вашия лекар.
- Не спирайте да приемате Едоксабан Полфарма, без да се консултирате с Вашия лекар, тъй като това може да увеличи риска да получите кръвен съсирек.
- Моля, прочетете листовката, намираща се във всяка опаковка Едоксабан Полфарма.

КОГА ДА ПОТЪРСИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ

РИСК ОТ КЪРВЕНЕ

Приемането на противосъсирващо лекарство (антикоагулант), като например Едоксабан Полфарма, може да повиши риска от кървене. Ето защо е важно да познавате възможните признаци и симптоми на кървене и да говорите с Вашия лекар **незабавно**, ако получите някое от следните:

- Образуване на синини или кървене под кожата
- Кръв в урината
- Изкашляне на кръв
- Повръщане на кръв или материя, която прилича на смляно кафе
- Кървене от носа или порязвания, които дълго време не спират да кървят
- Изпражнения с цвят на катран
- Световъртеж или внезапно главоболие
- Необяснима умора
- Неестествено вагинално кървене, включително по-тежка или продължителна менструация

Моля, говорете с Вашия лекар, ако получите някакви необичайни симптоми.

Version: 1.0/PPH/EDX/03.2026